

# CONEJOS

## DATOS DE INTERÉS



La vida media del conejo está entre 7 y 10 años.

La mayor parte de los roedores son coprófagos y suelen ingerir sus heces en forma de bolas directamente desde el ano. En general, ingieren de forma selectiva las heces que son más blandas y que se denominan cecotrofos. Estas heces se producen en el ciego y contienen vitaminas del complejo B y proteínas. Los roedores

jóvenes ingieren las heces de su madre y así proveen a su intestino de flora bacteriana necesaria para la digestión.

## TEMPERATURA AMBIENTAL

Idónea 16-21 °C, rango 4-27 °C. Evitar los cambios bruscos de temperaturas o las temperaturas extremas (superiores a 30 °C).

## INSTALACIONES

Se debe permitir al conejo que realice ejercicio, sacándolo de la jaula regularmente. Son jaulas específicas para conejos con bandeja de plástico alta y parte superior metálica. Hay que diferenciar una zona de descanso de una zona de alimentación y excreción.

**Tamaño:** como mínimo se recomienda 0,14 m<sup>2</sup> aconsejándose 0,5 m<sup>2</sup> por cada 2 Kg de peso

**Sustrato:** Viruta de madera, papel, heno o reja de 1 x 2,5 cm. El suelo no debe ser resbaladizo, la ventilación tiene que estar asegurada y debe cambiarse el sustrato de la jaula diariamente para evitar el acumulo de amoníaco. Debe asegurarse la higiene y desinfección regular de la jaula y complementos.

## COMPORTAMIENTO SOCIAL

Son animales territoriales. Machos y hembras marcan el territorio mediante glándulas ( submandibulares, inguinales y anales). De ésta manera el macho dominante marca a las hembras y a sus crías. Los ejemplares que no pertenezcan al grupo serán expulsados, llegando incluso a matarlos. Hay que evitar que convivan varios machos en la misma jaula.

## ALIMENTACIÓN

La fibra no digestible (debe corresponder como mínimo a un 20 % del total de la dieta) aumenta el tránsito intestinal y previene la formación de bolas de pelo. Dietas con un alto contenido calórico predisponen a la enterotoxemia y a la obesidad, y cualquier cambio en la dieta deberá realizarse de forma progresiva (4-5 días) para permitir la adaptación de la microflora del ciego.

Prefieren las porciones tiernas de las plantas y los alimentos dulces. Ingieren alimentos fibrosos para asegurar el tránsito gastrointestinal. Son muy selectivos con los alimentos y rechazan aquellos a los que no están acostumbrados.

### *Composición de la dieta*

- ❑ Hierba fresca (césped, diente de león, alfalfa...) y seca (heno, paja...), y algo de verduras (acelgas, hojas de col, hojas de zanahoria, brócoli, nabo...)
- ❑ Un mínimo de pienso formulado (con un contenido de proteína inferior al 16 % y un mínimo de un 18% de fibra).
- ❑ Suplementos: pan integral duro, algarrobas... Si la dieta es equilibrada no son necesarios los suplementos vitamínicos ni minerales.

## VACUNACIONES

- A los 2 meses: Vacuna vírica hemorrágica ( revacunación anual)
- A los 3 meses: Mixomatosis (revacunación semestral). Es un virus que causa hinchazón de cara y zona genital, muy contagioso. No hay forma de tratar con éxito ésta enfermedad.
- También conviene vacunar de Pasteurella cada 3 meses. Los signos clínicos de ésta enfermedad son neumonía, tortícolis, pérdida de peso con anemia y abortos en los conejos de cría.

## DESPARASITACIONES

Los conejos hay que desparasitarlos cada cuatro meses contra los nematodos (lombrices). mucho cuidado también con los coccidios.

Hay que tener especial cuidado con los ácaros de la sarna y las pulgas.

## CONSEJOS

- ⊕ No deje a su conejo suelto en casa solo. Se aburren y mastican todo, desde puertas y libros hasta cables de electricidad.
- ⊕ Si hay algún perro o gato conviviendo con ellos, no los deje sueltos sin vigilancia.

⊕ El conejo soporta mal el calor, puede morir de manera súbita por eso, manténgalo a la sombra y en ambiente fresco.

⊕ La diarrea por una mala dieta es muy frecuente. Consulte cuanto antes con su veterinario.

⊕ El esqueleto del conejo es muy delicado a diferencia de sus músculos que están muy desarrollados para correr. Un manejo inadecuado puede hacer que el conejo comience a patear con un riesgo grave de fractura de columna.