

ENFERMEDAD URINARIA FELINA

Se trata de una alteración en la micción. Es más frecuente en machos debido a que el tamaño de la uretra es menor y es más fácil que se produzca una obstrucción por inflamación o cristales.

Es un proceso producido por múltiples factores entre los que se incluyen :

- Infección de orina
- Cristales microscópicos en la orina
- Estrés
- Alteraciones anatómicas

Los principales signos clínicos que se observan en el animal son:

- Polaquiuria: orina con frecuencia pero poco volumen, suele tener molestia al orinar
- Disuria (dificultad para orinar) pudiendo llegar a incapacidad para orinar
- Ectopia miccional (orina en lugares inusuales)
- Hematuria (sangre en la orina)
- Bloqueo uretral (incapacidad para orinar)
- Maullidos durante la micción, dolor al orinar
- Se lame frecuentemente la zona urogenital

Otros signos clínicos asociados a la incapacidad de orinar son :

- Pérdida de apetito
- Vómitos
- Deshidratación

El tratamiento variará en función de los resultados de las pruebas realizadas (Radiografías y analíticas de sangre y orina) pero puede incluir los siguientes procedimientos:

- Sondaje uretral del gato bajo sedación profunda si existe obstrucción.
- Sueroterapia intravenosa si están elevados en sangre los niveles de urea y creatinina.
- Lavados de la vejiga con suero fisiológico a través de la sonda para limpiarla de restos de cristales.
- Antibióticos/antiinflamatorios/analgésicos
- Dietas especiales
- Seguimiento

Recuerde : El signo más grave es que el animal no orina durante 24 horas

!!!Esto se debe considerar una urgencia!!!